

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- **Captor 300** es un atrayente alimenticio, no requiere de precauciones ni advertencias especiales para su uso, se deben adoptar las medidas precautorias indicadas del insecticida con el que se mezcle.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO.
- NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES.
- MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.
- LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS.
- NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN.
- NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO.
- LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO.
- AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
- NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL.
- NO SE MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS. USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO.
- NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel y los ojos es suficiente con lavar utilizando agua limpia. Si el producto ha sido ingerido no es necesario provocar el vómito ni administrar medicamentos, es suficiente con beber abundante agua.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

- Grupo químico de **CAPTOR 300**: Proteína hidrolizada
- En caso de malestar deberá remitirse a las recomendaciones de la etiqueta del insecticida con el que se mezcle. **Captor 300** está catalogado como un producto no tóxico. No requiere de antídoto ni tratamiento específico. Adopte medidas sintomáticas en caso de alergia en personas susceptibles.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
- EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE POR EJEMPLO (TIERRA O ARCILLA). COLECTAR LOS Desechos EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO MÁS CERCANO.
- REALICE EL TRIPLE LAVADO Y VIERTA EL AGUA DEL ENGAUJE EN EL DEPOSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA LA APLICACIÓN.

“USO AGRÍCOLA”

CAPTOR 300



ATRAYENTE

proteína hidrolizada

Atrayente alimenticio para el control de moscas de la fruta
Solución acuosa

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

Composición:		% (p/p)
PROTEÍNA HIDROLIZADA: Aminoácidos derivados de la hidrólisis.....		33.00
(Equivalente a 360 g de I.A./L a 20 °C)		
Solventes (agua) y conservador		67.00
Total.....		100.00

Registro:RSCO-ATRA-0702-304-013-033

Contenido neto: 950 ml

PRECAUCIÓN

**PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA**

Lote:
Fecha de fabricación:
Caducidad: 2 años después
de su fabricación

TITULAR DEL REGISTRO:
PROMOTORA AGROPECUARIA
UNIVERSAL

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:
Agroquímica Tridente S.A. de C.V.,
Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F.
Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407,
Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017,
E-mail: tridente@prodigy.net.mx http://www.tridente.com.mx

“HECHO EN MÉXICO”

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Captor 300 se usa para la detección y control de moscas de la fruta, a través del trampeo y mediante aspersiones terrestres y aéreas en mezcla con agua y con insecticidas específicos por la COFEPRIS.

DOSIS:

Para el trampeo: 250 de mezcla por trampa.

Método para preparar el producto: En un recipiente mezclar 10 mL de Captor 300, 5g de Borax pentahidratado, 12 mL de propilenglicol y 223 mL de agua. Poner el contenido de la mezcla en cada trampa y cambiar cada 7 días.

En aspersiones terrestres: Aplicar 150-300 mL por árbol en la parte soleada en manchas circulares, de la parte media a la parte alta de la copa. En hileras alternas.

Método para preparar el producto: En un recipiente mezclar 10 mL del insecticida específico generalmente Malathion 500 o Malathion 1000, 40 mL de Captor 300 y 950 mL de agua.

En aspersiones aéreas: Aplicar 1 litro de mezcla por hectárea en franjas alternas.

Método para preparar el producto: En un recipiente mezcla 1 litro de Malathion Ultra bajo Volumen y 4 litros de Captor 300.

Las aplicaciones tanto en aspersiones terrestres como en aspersiones aéreas se deben realizar cada 7 días.

Intervalo entre la última aplicación y la recolección o cosecha del cultivo: Seguir lo establecido en la etiqueta del insecticida con que se mezcle.

Tiempo de reentrada a zonas tratadas: Seguir lo establecido en la etiqueta del insecticida con que se mezcle.

CONTRAINDICACIONES: Ninguna

INCOMPATIBILIDAD: La eficacia de Captor 300 puede ser afectada cuando se combina o se aplica sobre fungicidas cúpricos.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL



PELIGRO

