

# FICHA TÉCNICA DINASTIA MAX



**NOMBRE COMERCIAL: DINASTIA MAX**

## COMPOSICION PORCENTUAL

### FIPRONIL:

5-amino-1-(2,6-dicloro- $\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluoro-p-tolil)-4-trifluorometilsulfinilpirazol-3-carbonitrilo . **8.30% p/p**  
(Equivalente a 100 g de i.a./L a 20 °C)

### IMIDACLOPRID:

(E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilideneamina..... **29.00% p/p**  
(Equivalente a 350 g. de i.a. /L a 20 °C)

### INGREDIENTES INERTES:

Dispersantes, Anticongelante, Humectante, Portador, Estabilizador, Antiespumante,  
Espesante y Diluyente..... **62.70% p/p**

## FAMILIA O GRUPO QUIMICO:

**Fipronil:** Fenilpirazoles; **Imidacloprid:** Neonicotinoides.

**REGISTRO SANITARIO COFPRIS: RSCO-MEZC-INAC-1150-X035-064-37.3**

**TIPO DEFORMULACION:** Suspensión concentrada

## CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DEL PRODUCTO:

Densidad: 1.1680g/mL; pH: 6-8

## MODO DE ACCION DE DINASTIA MAX:

**DINASTIA MAX** combina la acción sistémica, traslaminar, de contacto y estomacal del **IMIDACLOPRID** con la acción de contacto, ingestión y residual del **FIPRONIL**; presentando una excelente actividad biológica sobre los insectos que se recomiendan en la etiqueta de **DINASTIA MAX**

## USOS AUTORIZADOS DE DINASTIA MAX:

**DINASTIA MAX** está autorizado para su aplicación foliar en los cultivos de ajo, cebolla, poro, berenjena, chile, jitomate, pimiento morrón, tomate de verde y papa.

**Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.**

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacan, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: [tridente@prodigy.net.mx](mailto:tridente@prodigy.net.mx). Página web: <http://www.tridente.com.mx>

# FICHA TÉCNICA DINASTIA MAX



## CUADRO DE PLAGAS, DOSIS Y RECOMENDACIONES:

**DINASTIA MAX** se recomienda para su uso en el combate y control de las plagas que se citan en los siguientes cultivos:

CULTIVOS	PLAGA	DOSIS L/Ha	RECOMENDACIONES
Ajo (21) Cebolla (21) Poro (21)	<b>Trips</b> ( <i>Thrips tabaci</i> )	1.0-1.25	Realizar una aplicación foliar cuando se detecte la presencia de la plaga en el cultivo; volumen de aplicación 350-450 L/ha.
Berenjena (3) Chile (3) Jitomate (3) Papa (3)	<b>Mosquita blanca</b> ( <i>Bemisia tabaci</i> )	1.0-1.25	Realizar una aplicación foliar cuando se detecte la presencia de la plaga en el cultivo; volumen de aplicación 300-400 L/ha.
Pimiento morrón (3) Tomate verde (3)	<b>Pulgón verde</b> ( <i>Myzus persicae</i> )	0.75-1.25	Realizar una aplicación foliar cuando se detecte la presencia de la plaga en el cultivo; volumen de aplicación 300-400 L/ha.

( ) **INTERVALO DE SEGURIDAD:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

## PERIODO DE REINGRESO A LOS LUGARES TRATADOS:

24 horas después de la última aplicación.

## MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR DINASTIA MAX:

Durante el manejo y aplicación de este producto siempre utilice su equipo de protección personal limpio y completo.

Agite vigorosamente el envase antes de usar el producto. Desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción).

Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el follaje del cultivo a proteger. Llene el tanque de aplicación hasta

**Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.**

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacan, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: [tridente@prodigy.net.mx](mailto:tridente@prodigy.net.mx). Página web: <http://www.tridente.com.mx>

# FICHA TÉCNICA DINASTIA MAX



la mitad de su capacidad con agua. Mida la cantidad de producto a utilizar con una probeta graduada. Agregar el producto a la dosis recomendada, efectuar el triple lavado del envase y agregar el agua de los lavados al tanque, completar hasta su capacidad total con agua manteniendo en constante agitación, mezcle con un trozo de madera o algún otro material (nunca con las manos). La mezcla deberá ser aplicada el mismo día de su preparación y evite utilizarlo de un día para otro.

Se sugiere hacer las aplicaciones temprano en la mañana o por la tarde, cuando la temperatura y la radiación solar no sean altas a fin de evitar fitotoxicidad y/o daños por quemadura al cultivo. Aplicar a favor del viento.

**Equipos de aplicación terrestre:** Equipo terrestre de mochila manual o motorizada. Debe asegurarse un buen cubrimiento de las áreas infestadas.

## CONTRAINDICACIONES:

No aplicar si existe alta probabilidad de lluvia próxima a fin de evitar la pérdida del producto por lavado. No aplicar si la velocidad del viento es mayor 10 km/hr, ni cuando las abejas y otros polinizadores estén en el cultivo.

## MANEJO DE RESISTENCIA

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

## EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:

Use el equipo de protección personal (EPP) limpio y completo: mascarilla contra vapores tóxicos, mascarilla contra salpicaduras, gorra de algodón o sombrero, camisa de manga larga, pantalones largos, delantal tipo industrial resistente a productos químicos, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno. Se recomienda utilizar un overol de algodón sobre la ropa, para evitar infiltración del producto al cuerpo.

**Agroquímica Tridente, S.A. de C.V.**

Inglaterra 37, Parque San Andres, Coyoacan, C.P. 04040, Ciudad de México

Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: [tridente@prodigy.net.mx](mailto:tridente@prodigy.net.mx). Página web: <http://www.tridente.com.mx>