


# FICHA TÉCNICA KOA 80 WG



## IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

**KOA 80 WG** es un herbicida pre-emergente a la maleza y post-emergente al cultivo, que pertenece al grupo químico de las ureas sustituidas; indicado para usar en el cultivo de **Caña de Azúcar**.

Presentado como Gránulos Dispersables que permite su fácil uso y aplicación con agua.

Su formulación se compone de:

Diurón: N'-(3, 4 diclorofenil)-N, N-dimetilurea no menos de 80.00% (Equivalente a 800 g de I.A. /Kg a 20 °C).

Ingredientes inertes: Surfactante, agente anti-aglomerante y diluyente, no más de 20.00 %.

Pertenece al grupo químico de las **DIMETIL UREAS**

**REG:** RSCO-HEDE-0221-376-034-080

## FORMA DE ABRIR EL ENVASE Y MÉTODO DE APLICACIÓN:

Para abrir el envase, cortar cuidadosamente con unas tijeras la parte superior de la bolsa, realizar esta operación con mucha precaución para evitar el contacto e inhalación del producto.

Llenar con agua hasta la mitad, el tanque del equipo aspersor. En un recipiente aparte, y en poca agua, diluir la cantidad sugerida de **KOA 80 SC**, agitar enérgicamente. Agregar esta mezcla al tanque del aspersor, bajo agitación. Llene finalmente hasta su capacidad total el tanque del equipo aspersor con agua, agitando. Mantener la mezcla en agitación durante el tratamiento.



# FICHA TÉCNICA KOA 80 WG

---

## INDICACIONES DE APLICACIÓN, DOSIS Y MALEZAS QUE CONTROLA

---

La dosis recomendada para el cultivo de caña de azúcar, es de 2.0 – 2.5 Kg de **KOA WG** por hectárea, la aplicación se realiza una vez que se realiza la siembra en seco, dar un riego de germinación. Realizar una la aplicación en forma total en pre-emergencia al cultivo y a la maleza antes de la aplicación de riego de germinación. Combate malezas de Bledo (*Amaranthus hybridus*); Malva (*Malva parviflora*); Zacate choneano (*Echinochloa colonum*) y Verdolaga (*Portulaca oleraceae*). El intervalo es de 60 días entre la última aplicación y la cosecha.

## CONTRAINDICACIONES

---

En aplicaciones post-emergentes no aplicar cuando la temperatura sea menor a 20° C. No aplicar en suelos arenosos. No aplicar cuando los cultivos tengan enfermedades en la raíz.

## INCOMPATIBILIDAD:

---

No mezclarlo con agroquímicos de fuerte reacción alcalina, en caso que requiera mezclarlo con otro herbicida autorizado, realizar pruebas en pequeñas cantidades antes de aplicar las mezclas, con la finalidad de evitar efectos fito-tóxicos. Para la realización de mezclas estas deberán hacerse con productos registrados para la combinación cultivo-plaga.

