

FICHA TÉCNICA PARATION METÁLICO Microencapsulado

500



NOMBRE COMERCIAL: PARATIÓN METÁLICO Microencapsulado 500

FAMILIA O GRUPO QUÍMICO: Organofosforado

COMPOSICIÓN PORCENTUAL (P/P): Paratión Metílico: O,O-dimetil-0-(4-nitrofenil fósforotioat 40.00 %

(Equivalente a 450 g de I.A./L)

Disolventes, emulsificantes, y compuestos relacionados, no más de **60.00 %**

REG: RSCO-INAC-0155-431-085-040

TIPO DE FORMULACIÓN: Insecticida Agrícola /Microencapsulado

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO: Líquido viscoso color beige con olor parecido al ajo picante.

MODO DE ACCIÓN: **Metil Paratión 450 g/l CS** es una suspensión acuosa de un microencapsulado poroso que contiene una solución del ingrediente activo Metil Paratión en un solvente aromático. La cápsula es un polímero de poliurea. El contenido de materia activa de **Metil Paratión** es de 450 g/L.

PLAGAS, DOSIS Y OBSERVACIONES:

CULTIVO	PLAGA	I.S. * Días	DOSIS ** (L/ha)
Cebolla	Trips: <i>Thrips tabaci</i> ; <i>Frankliniella spp.</i> Pulgones: <i>Aphis spp</i>	15	1.0
	Gusano trozador: <i>Agrotis spp.</i> , Mosca de la raíz: <i>Hylemya antigua</i> , Chinchas: <i>Halticuss spp.</i> , <i>Lygus sp.</i>		0.75 a 1.0
Alfalfa	Pícuo de alfalfa: <i>Hypera brunneipenais</i> , Pulgones: <i>Acyrtosiphon pisum</i> , Gusano trozador: <i>Agrotis spp.</i> , Chinchas: <i>Lygus spp.</i> <i>Creontiades rubrinerveis</i>	15	0.5 a 2.0
Algodonero	Trips: <i>Frankliniella spp.</i> <i>Caliothrips phaseoli</i> , Pulgones: <i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i> , Picudo: <i>Anthonomus grandis</i> ; Pulgas saltonas: <i>Pseudatomacelis senatus</i> , <i>Spanagonicus albolasciatus</i> ; <i>Chlorachroa ligata</i> , <i>Nezara viridula</i> , Trips: <i>Frankliniella spp</i> ; Trips: <i>Thrips tabaci</i> , Grillos <i>Achela assimilis</i> ; Chinchas: <i>Lygus spp.</i> <i>Creontiades spp.</i>	7	1.0 a 3.0
Avena,	Pulgones <i>Rhopalosiphum maidis</i> ; <i>Schizaphis graminum</i> . <i>Macrosiphium avenae</i> .	15	0.75 a 1.0
	Chinchas: <i>Blissus leucapterus</i> , Trips: <i>Frankliniella spp.</i> ,		

Agroquímica Tridente S.A. de C.V., Heriberto Frías 1529-703 Colonia del Valle C.P. 03100 México D.F. Teléfono conmutador: (55) 9183-2400, Ventas: (55) 9183-2406, (55) 9183-2407, Fax: (55) 9183-2420, Lada: 01-800-2025-017, E-mail: tridente@prodigy.net.mx Pagina web: <http://www.tridente.com.mx>



Cebada,	Gusano soldado: <i>Mythimna</i>		
Arroz, Trigo	Unipuncia, Chicharritas: <i>Sogata spp</i> (sólo em cultivo de arroz)		
Tabaco	Gusano del cuerno: <i>Manduca quinquemaculata</i> , Gusano trozador. <i>Agrotis spp.</i> Picudo: <i>Trichobaris champiori</i>	SIN LIMITE	1.0 a 1.5
Papa	Pulga saltona: <i>Epitrix spp.</i> , <i>Chaetocnema spp.</i> , Pulgones: <i>Aphis gossypii</i> ; Trips: <i>Thrips sp.</i> , Catarinita de la papa: <i>Leptinotarsa undecemlineata</i>	5	1.0 a 1.5
Calabaza	Chicharritas: <i>Empoasca spp.</i> , Pulgones: <i>Aphis gossypii</i> , Pulga saltona: <i>Epitrix cucumeris</i> ; Chinchas: <i>Anasa tristis</i> ; Doradillas: <i>Diabrotica spp.</i> , Barrenadores de guias: <i>Melittia satyriniformis</i> ; Gusano trozador: <i>Agrotis spp.</i>	21	1.0 a 1.5
Pastos	Chinche de encaje: <i>Leptodyctia tebida</i> ; Gusanos soldado: <i>Mythimna unipuncta</i> ; Chicharritas: <i>Dalbulus elimatus</i> ; Chinchas: <i>Lygus spp.</i> , Adultos de salivazos: <i>Aeneolamia postica</i> ; <i>Prosapia simulans</i>	15	1.0 a 1.5
Cacahuete	Doradillas: <i>Diabrotica spp.</i> ; Chicharritas: <i>Empoasca tabae</i> ; Trips: <i>Frankliniella spp.</i> ; <i>Caliothrips phaseoli</i>	21	1.0 a 1.5
Soya	Trips: <i>Frankliniella spp.</i> ; <i>Caliothrips phaseoli</i> ; Gusano terciopelo: <i>Anticarsia gemmatilis</i>	20	1.0 a 1.5
Girasol	Pulgones: <i>Pentatrichopus spp.</i> , Trips: <i>Thrips spp.</i> , Chicharritas: <i>Empoasca spp.</i> , Gusano trozador: <i>Agrotis spp.</i>	30	0.75 a 1.0
Maíz	Pulgones: <i>Rhopalosiphum maidis</i>; <i>Schizaphis graminum</i>, Trips: <i>Thrips sp.</i>, <i>Frankliniella sp.</i> Gusano trozador: <i>Agrotis spp.</i>, Doradillas: <i>Diabrotica spp.</i>, Chinchas: <i>Lygus spp</i>; Grillos <i>Achela assimilis</i>; Frailecillo: <i>Macrodactylus mexicanus</i>; Gusanos soldado: <i>Mythimna unipuncta</i>	12	0.75 a 1.0

*) Intervalo de seguridad en días a transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**) La variación en las dosis depende del desarrollo de los cultivos y grado de infestación de las plagas. Debe aplicarse con suficiente cantidad de agua, según el equipo de aplicación y el tamaño y frondosidad de las plantas. Con aspersora manual se usan 200 a 400 L/ha, con tractor desde 40, 100 ó 200 L/ha.

METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Abra el envase rompiendo el sello de garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación se recomienda hacer una premezcla en un recipiente por separado colocando una pequeña porción de agua y agitar, después verter la premezcla al tanque del equipo en donde se le agrega posteriormente la totalidad de agua calculada en la calibración, antes de hacer la aplicación calibre el equipo de aplicación.

FICHA TÉCNICA PARATION METÍLICO Microencapsulado 500



INCOMPATIBILIDAD: Este producto NO puede aplicarse en mezcla con compuestos de fuerte reacción alcalina como el cado bordes.

FITOTOXICIDAD: METILICO 500 MICROENCAPSULADO si se aplica a las dosis recomendadas no es fitotóxico.

CONTRAINDICACIONES: No realizar más de dos aplicaciones de METILICO 500 MICROENCAPSULADO en el cultivo de soya, no hacer mezclas con otros plaguicidas o surfactantes debido a que se puede incrementar la toxicidad y acortar la efectividad biológica.